

Impiego di una siringa pre-riempita di Sanofi per il trattamento della trombosi

Istruzioni per l'autoiniezione da parte del paziente

Il suo medico le ha prescritto eparina a basso peso molecolare.

- Lo scopo del trattamento è prevenire una trombosi o un'embolia polmonare oppure sciogliere un coagulo di sangue presente.
- Può fare l'iniezione in autonomia oppure chiedere aiuto a una persona di sua fiducia.

Facile preparazione



1. Si lavi le mani. Scegli un sito sul lato destro o sinistro dell'addome. Il sito di iniezione dovrà distare lateralmente almeno 5 cm dall'ombelico. Deterga il sito di iniezione prescelto con un tampone imbevuto di alcol oppure con acqua e sapone. Si sieda oppure si corichi in posizione comoda e rilassata. Dovrà continuare a poter vedere il sito di iniezione.



2. Prenda la siringa e tolga il tappo protettivo.

È possibile che sulla punta dell'ago sia presente una goccia. In questo caso, prima dell'iniezione è necessario eliminare la goccia picchiando la siringa pre-riempita con l'ago rivolto verso il basso. A questo punto è possibile eseguire l'iniezione.

Non elimini la bolla d'aria presente nella siringa pre-riempita!



3. In corrispondenza del sito di iniezione deterso crei una piega cutanea con il pollice e l'indice, che dovrà mantenere fino all'estrazione dell'ago di iniezione.

Facile iniezione



4. Inserisca l'ago per tutta la lunghezza, verticalmente con un angolo di 90°, prema con cautela verso il basso lo stantuffo della siringa e inietti l'intero contenuto della siringa (si attenga ad eventuali indicazioni posologiche differenti fornite dal suo medico). Non allenti la presa sulla piega cutanea.

È importante premere completamente lo stantuffo della siringa affinché il meccanismo di protezione possa attivarsi.



5. Quando l'iniezione è stata completata, estraiga la siringa tenendola dritta. L'involucro protettivo si sposta automaticamente sull'ago fino a racchiuderlo.

A questo punto può lasciare la piega cutanea.



6. Getti la siringa usata in un contenitore per rifiuti taglienti. Chiuda con cautela il coperchio del contenitore e conservi il contenitore fuori dalla portata dei bambini.



Scansionando il codice QR troverà ulteriori informazioni nell'Inject-App per il suo dispositivo smart (iOS, Android)!



Può scaricare le istruzioni in altre 10 lingue!
www.thromboseportal.eu/injektionsanleitung

Il logo Apple e l'App Store sono marchi registrati di Apple Inc. Il logo Android e Google Play sono marchi di Google LLC.

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Potsdamer Straße 8 10785 Berlin

SANOFI